

高级计量经济学

理论经济学博士课程 2023-2024

Lecture 8: Large Sample Tests, CI, HCCME

Davidson, R. & MacKinnon, J. (2009). *Econometrics Theory and Methods*. Oxford University Press.

黄嘉平

工学博士 经济学博士
深圳大学中国经济特区研究中心 讲师

办公室 粤海校区汇文楼1510
E-mail huangjp@szu.edu.cn
Website <https://huangjp.com>

大样本检验

精确检验的条件

我们把精确检验 (t 检验和 F 检验) 所需的条件总结如下:

- X 与 u 独立
- $u \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 I)$

如果以上条件不能被满足, 就无法获得 t 统计量或 F 统计量的精确分布。

在大样本 ($n \rightarrow \infty$) 下, 我们可以获得检验统计量的渐进分布。

中心极限定理

Central Limit Theorem (CLT)

Lindeberg-Lévy 中心极限定理：如果 X_i 为 i.i.d. 且 $E[X_i^2] < \infty$ ，则当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} Z \sim N(0, \sigma^2)$$

此处 $\mu = E[X_i]$, $\sigma^2 = E[(X_i - \mu)^2]$, $N(a, b^2)$ 为均值为 a 方差为 b^2 的正态分布

- 在有限样本下， $Z_n = \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$ 的均值为 0，方差为 σ^2 。LLN 告诉我们 Z_n 的渐进分布是正态分布

- $$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$$

CLT 和 LLN 的最大区别在于，LLN 中的乘数是 $1/n$ ，而 CLT 中的乘数是 $1/\sqrt{n}$ 。

- 当 \mathbf{x}_t 是随机向量时，CLT 可以写成

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{t=1}^n \mathbf{x}_t = \mathbf{x}_0 \sim N(\boldsymbol{\mu}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \text{Var}[\mathbf{x}_t])$$

大样本下的单一约束检验

我们假设回归模型满足 $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \sim \text{IID}(\mathbf{0}, \sigma_0^2 \mathbf{I})$, 其中误差项满足 $E[u_t | \mathbf{X}_t] = 0$, $E[u_t^2 | \mathbf{X}_t] = \sigma_0^2$ 。同时假设 $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}$, $\mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}$ 是有限非随机正定矩阵。在这个假设下, OLS 估计量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 满足一致性。

针对 $H_0: \beta_2 = 0$, 已知 t 统计量可以写成

$$t_{\beta_2} = \sqrt{\frac{n-k}{\mathbf{y}^\top \mathbf{M}_X \mathbf{y}}} \cdot \frac{\mathbf{x}_2^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{y} / \sqrt{n}}{\sqrt{\mathbf{x}_2^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{x}_2 / n}}$$

根据 LLN, 第一项依概率收敛于 $\frac{1}{\sigma_0}$, 同时在 H_0 成立时 $\mathbf{M}_1 \mathbf{y} = \mathbf{M}_1 \mathbf{u}$, 因此

$$t_{\beta_2} \xrightarrow{p} \frac{\mathbf{x}_2^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{u} / \sqrt{n}}{\sigma_0 \sqrt{\mathbf{x}_2^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{x}_2 / n}}$$

右侧概率极限的分子符合 CLT 的形式, 且其期望值为零, 方差等于分母, 因此可得 $t_{\beta_2} \stackrel{a}{\sim} N(0,1)$ (渐进分布是标准正态分布)。
(详见 pp. 152-154)

\sqrt{n} 一致性

Root- n consistency

如果定义 $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{X}^\top \mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{t=1}^n u_t \mathbf{X}_t^\top$, 则根据 CLT 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &\stackrel{a}{\sim} N\left(\mathbf{0}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \text{Var}[u_t \mathbf{X}_t^\top]\right) = N\left(\mathbf{0}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n E[u_t^2 \mathbf{X}_t^\top \mathbf{X}_t]\right) \\ &= N(\mathbf{0}, \sigma_0^2 \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}) \end{aligned}$$

因 $\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_0 = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{u}$, 根据 LLN 可知其概率极限为 $\mathbf{0}$, 因此其协方差矩阵的概率极限是零矩阵。但是

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_0) = \left(\frac{1}{n} \mathbf{X}^\top \mathbf{X}\right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{X}^\top \mathbf{u}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 右侧第一项依概率收敛于 $\mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}^{-1}$, 而第二项正是上面定义的 \mathbf{v} , 因此,

$$\text{Var}[\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_0)] = \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}^{-1} (\sigma_0^2 \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}) \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}^{-1} = \sigma_0^2 \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}^{-1} \quad (\text{注意 } \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}^{-1} \text{ 是对称矩阵})$$

因此,

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_0) \stackrel{a}{\sim} N(\mathbf{0}, \sigma_0^2 \mathbf{S}_{\mathbf{X}^\top \mathbf{X}}^{-1})$$

这意味着 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 收敛至概率极限 $\boldsymbol{\beta}_0$ 的速度是 $1/\sqrt{n}$, 因此称为 \sqrt{n} 一致 (root- n consistent)。

大样本下的多重约束检验

已知多重约束检验的 F 统计量是

$$F_{\beta_2} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2 (\mathbf{X}_2^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2)^{-1} \mathbf{X}_2^\top \mathbf{M}_1 \boldsymbol{\varepsilon} / r}{\boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M}_X \boldsymbol{\varepsilon} / (n - k)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{u} / \sigma_0$$

可以将其改写成

$$F_{\beta_2} = \frac{n^{-1/2} \boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2 (n^{-1} \mathbf{X}_2^\top \mathbf{M}_1 \mathbf{X}_2)^{-1} n^{-1/2} \mathbf{X}_2^\top \mathbf{M}_1 \boldsymbol{\varepsilon} / r}{\boldsymbol{\varepsilon}^\top \mathbf{M}_X \boldsymbol{\varepsilon} / (n - k)}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 可得 $rF_{\beta_2} \sim \chi^2(r)$, 或 $F_{\beta_2} \sim F(r, \infty)$ 。

(尝试推导此结论)

置信区间

区间估计

Interval Estimation

真实参数值 θ 和估计量 $\hat{\theta}$ 之间的关系是

$$\theta = \hat{\theta} + \text{抽样误差}$$

$\hat{\theta}$ 是 θ 的点估计 (point estimation)，而 $\hat{\theta}$ 加上抽样分布可以给出区间估计 (interval estimation)。





Figure 8.5 A sample of one hundred observed 95% confidence intervals based on samples of size 26 from the normal distribution with mean $\mu = 5.1$ and standard deviation $\sigma = 1.6$. In this figure, 94% of the intervals contain the value of μ .




DeGroot & Schervish (2012), *Probability and Statistics*, 4th Edition, Pearson. (p.478)

根据正态分布 $N(\mu = 5.1, \sigma^2 = 1.6^2)$ 随机生成 $n = 26$ 的样本，然后生成置信区间。图中包含了100个这样的置信区间，其中94个包含真实的分布均值 $\mu = 5.1$ 。

线性回归系数的置信域

Confidence Region of Linear Regression Coefficients



多变量估计量的置信域通常可以写成

$$\text{变量的二次函数} \leq C$$

的形式，其图形含义为椭圆或椭圆柱体。

注意图中置信域和一维置信区间的区别！

Figure 5.3 Confidence ellipses and confidence intervals

异方差稳健计量

异方差性及其影响

Heteroskedasticity and its Consequences

异方差性: $\text{Var}[\mathbf{u} | \mathbf{X}] = \mathbf{\Omega}$, $\mathbf{\Omega}$ 的非对角要素为零, 对角要素 ω_t^2 不相同。

在外生性成立时, $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 的协方差矩阵可以写成

$$\begin{aligned}\text{Var}[\hat{\boldsymbol{\beta}}] &= E[(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_0)(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}_0)^\top] \\ &= (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{\Omega} \mathbf{X} (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}\end{aligned}$$

最后一行的表达式被称为 sandwich covariance matrix。 详见 Lecture 6

异方差性的影响:

- OLS 估计量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 不再是最有效的, 但还是一致的。
- $s^2(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ 不再是协方差矩阵的非偏估计量, 因此影响假设检验的准确性。

异方差时的一致估计

Consistent Estimation under Heteroskedasticity

当 ω_t^2 未知时，我们通常需要对其进行估计。但是我们只有 n 个观测值，却需要估计 n 个 ω_t^2 ，因此无法直接得到 Ω 的一致估计量。

但是我们可以估计 OLS 估计量的协方差矩阵。这里我们用 $\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta_0)$ 替代 $\hat{\beta}$ ，则有

$$\begin{aligned}\text{Var}[\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta_0)] &= E[n(\hat{\beta} - \beta_0)(\hat{\beta} - \beta_0)^\top] \\ &= \left(\frac{1}{n}X^\top X\right)^{-1}\left(\frac{1}{n}X^\top \Omega X\right)\left(\frac{1}{n}X^\top X\right)^{-1}\end{aligned}$$

已知 $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(X^\top X)^{-1} = (S_{X^\top X})^{-1}$ ，我们可以用 $\frac{1}{n}(X^\top X)^{-1}$ 作为该极限的一致估计量。

中间项的极限 $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}X^\top \Omega X$ 是 $k \times k$ 的对称矩阵，因此只有 $\frac{1}{2}k(k+1)$ 个参数需要估计。在一定条件下，我们可以通过 Ω 的某些非一致估计量 $\hat{\Omega}$ 对该项进行一致估计，即 $\frac{1}{n}X^\top \hat{\Omega} X$ 。（White, 1980）

在实际应用中，我们可以忽略 $1/n$ 而直接估计 $\hat{\beta}$ 的协方差矩阵：

$$\widehat{\text{Var}}_h[\hat{\beta}] = (X^\top X)^{-1}X^\top \hat{\Omega} X(X^\top X)^{-1}$$

这种估计量被称为 heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator (HCCME)，或 heteroskedasticity-robust estimator。

HCCMEs

HCCME 的关键是如何找到合适的估计量 $\hat{\Omega}$ 。因为 Ω 是对角矩阵， $\hat{\Omega}$ 也是对角矩阵。下面通过定义 $\hat{\Omega}$ 的第 t 对角要素介绍几种常用的 HCCME。

- $HC_0 : \hat{u}_t^2$
- $HC_1 : \frac{n}{n-k} \hat{u}_t^2$
- $HC_2 : \hat{u}_t^2 / (1 - h_t)$, h_t 是 P_X 的第 t 对角要素
- $HC_3 : \hat{u}_t^2 / (1 - h_t)^2$

这四个 HCCME 都满足一致性，但在有限样本下表现都不够好。四个当中 HC_0 表现最差， HC_2 或 HC_3 表现最好。

需要注意的是，有些软件里的默认设定是使用 HC_0 ，在实践操作中需要人为指定。

课外阅读

- White, H. (1980).
A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity.
Econometrica, 48:4, 817-838.
<http://www.jstor.org/stable/1912934>
- MacKinnon, J. G. and White, H. (1985).
Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties.
Journal of Econometrics, 29:3, 305-325.
[https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)
- MacKinnon, J. G. (2005).
Thirty Years of Heteroskedasticity-Robust Inference.
In: Chen, X. and Swanson, N. R. (eds.), *Recent Advances and Future Directions 437 in Causality, Prediction, and Specification Analysis*, 437-461, Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1653-1_17